

Produktdatablad

NoroTec™ Magnesium



Användningsområde

Bladgödsel mot magnesiumbrist i jordbruksgrödor.

Innehåll per liter

54 g magnesium, 105 g kväve.

Innehållet är komplexbundet.

Användning

Magnesium ingår i klorofyllet, det för växtens fotosyntes avgörande organiska ämne. Magnesium har också andra funktioner i växten. Störst behov har sockerbeter och stråsäd.

Magnesiumbrist ger blekgul färg. Ofta är denna ojämn, så att fläckighet uppkommer på bladen med de ljusaste partierna mellan bladnerverna. Stråsädesbladen får ett typiskt mönster med mörkare gröna punkter på ljusare botten.

NoroTec™ Magnesium skall användas i ett tidigt skede för att få bäst effekt.

Den låga dosen används vid förebyggande behandling och den höga vid bristsymptom. Eventuellt måste behandlingen upprepas. Första behandlingen kan i vanliga fall ske vid ogräsbekämpning.

Dosering och behandlingstidpunkt

Gröda	Behandlingstidpunkt	Dosering NoroTec™ Magnesium liter per ha	Vattenmängd liter per ha
Potatis	Vid radtäckning samt i slutet av tillväxt perioden	1,0-2,0	200-300
Sockerbeter	4-6 bladstadiet-radtäckning	1,0-2,0	100-200
Raps	4 bladstadiet-knoppstadiet	1,0-2,0	200-300
Raps	Stjälksträckning-före blomning	2 + 1 l Flytande Bor + 1 l NoroTec Mangan	200-300
Stråsäd	Vid bestockning	1,0-2,0	100-200

Blandbarhet

NoroTec™ Magnesium är komplexbundet och är därför blandbart med flertalet växtskyddsprodukter. Följ alltid anvisningarna på etiketten för respektive växtskyddsmedel.

Vid tveksamhet kontrollera blandbarheten. Kontakta din leverantör för ytterligare information.

Tillredning och behandling

Sprutbehållaren fylls till 3/4 med vatten och ingredienserna tillsätts i den nedan angivna ordningen.

Omrörningen skall vara igång hela tiden.

- Bekämpningsmedel i enlighet med instruktion
- NoroTec™ Magnesium
- Fyll därpå resterande mängd vatten.

Försiktighetsåtgärder

Vid solig väderlek utförs behandlingarna på morgon eller kväll. Bespruta ej växter som är täckta av vattendroppar eller före väntat regn. Arbetsvätskans temperatur skall vara min. 10°C

Rengöring

Spruta: Rengör all sprututrustning före och efter behandlingen. Vid blandning med bekämpningsmedel, följ rengöringsinstruktionen för bekämpningsmedlet.

Tomemballage: Sköljs tre gånger. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Rengjort tomemballage lämnas till avsedd uppsamlingsplats inom kommunen.

Produktdatablad

NoroTec™ Magnesium



Varningstext

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av sprutdimma.

Lagring

Förvaras i ett svalt och torrt förråd utom räckhåll för barn och djur. *Lagringstemperatur 0°C till +30°C.*
Hållbarhet 2 år.