

# Produktdatablad

## NoroTec™ Universal



### Användningsområde

Bladgödsel i jordbruksgrödor.

#### Innehåll per liter:

16g kväve, 20g kalium, 36g magnesium, 50g svavel, 5g bor,  
14g koppar, 8g järn, 12g mangan, 9g zink, 0,3g molybden.  
Innehållet är komplexbundet.

#### Användning

NoroTec™ Universal är en komplett mikronäringsprodukt för jordbruksgrödor som innehåller samtliga viktiga mikronäringsämnen samt några makronäringsämnen.

#### Dosering och behandlingstidpunkt

| Gröda             | Behandlingstidpunkt  | Dosering<br>NoroTec™ Universal<br>liter per ha | Vattenmängd liter<br>per ha |
|-------------------|--|--|-----------------------------|
| Stråsäd           | 1:a beh. DC 30, slut bestockning   | 1  | 100-200                     |
| Stråsäd           | Vid behov, 2:a beh. DC 37-44,<br>stråskjutning   | 1  | 100-200                     |
| Stråsäd           | Vid behov, 3:e beh. DC 49-51,<br>axskjutning   | 1  | 100-200                     |
| Socketor<br>betor | 1:a beh. 6-10 blad<br>Vid behov, 2:a beh. 14 dagar senare<br>Vid behov, 3:e beh. 14-20 dagar senare            | 1,5<br>1,5<br>1,5                              | 100-200                     |
| Potatis           | 1:a beh. 2 veckor efter uppkomst<br>Vid behov, 2:a beh. Före blomning<br>Vid behov, 3:e beh. Vid fruktsättning | 1,5<br>1,5<br>1,5                              | 100-200                     |
| Raps              | 1:a beh. Tidigt på våren<br>Vid behov, 2:a beh. 10 dagar senare<br>Vid behov, 3:e beh. 10-14 dagar senare      | 1,5<br>1,5<br>1,5                              | 100-200                     |
| Ärter, bönor      | 4-6 blad   | 1  | 200                         |

#### Blandbarhet

NoroTec™ Universal är komplexbundet och är därför blandbart med flertalet växtskyddsprodukter. Följ alltid anvisningarna på etiketten för respektive växtskyddsmedel.

Vid tveksamhet kontrollera blandbarheten. Kontakta din leverantör för ytterligare information.

#### Tillredning och behandling

Sprutbehållaren fylls till 3/4 med vatten och ingredienserna tillsätts i den nedan angivna ordningen.

Omrörningen skall vara igång hela tiden.

- Bekämpningsmedel i enlighet med instruktion
- NoroTec™ Universal
- Fyll därpå resterande mängd vatten.

#### Försiktighetsåtgärder

Vid solig väderlek utförs behandlingarna på morgon eller kväll.

# Produktdatablad

## NoroTec™ Universal



Bespruta ej växter som är täckta av vattendroppar eller före väntat regn  
Arbetsvätskans temperatur skall vara min. 10°C

### Rengöring

Spruta: Rengör all sprututrustning före och efter behandlingen. Vid blandning med bekämpningsmedel, följ rengöringsinstruktionen för bekämpningsmedlet.

Tomemballage: Sköljs tre gånger. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Rengjort tomemballage lämnas till avsedd uppsamlingsplats inom kommunen.

### Varningstext

Irriterar ögonen och huden.

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av sprutdimma. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.

### Lagring

Förvaras i ett svalt och torrt förråd utom räckhåll för barn och djur.

*Lagringstemperatur +/-0°C till +30°C. Hållbarhet 2 år.*