

Produktdatablad

NoroTec™ SoftFruit 1+2 med mikronäring



Användningsområde

Flytande NPK-lösning med mikronäring till bär/frukt

Innehåll per liter SoftFruit1:

48,6 g totalkväve, 38,1 g nitratkväve, 3 g ammoniumkväve, 7,9 g fosfor, 34,9 g kalium, 30 g kalcium, 1,8 g magnesium + mikro.

Innehåll per liter SoftFruit2:

40,6 g totalkväve, 34,2 g nitratkväve, <0,1 g ammoniumkväve, 6,5 g fosfor, 69,7 g kalium, 6,4 g kalcium, 4,5 g magnesium + mikro.

Innehållet är komplexbundet,.

Användning

Tillförs för att få en starkare, bättre och mer välmående planta under hela växtperioden och med rätt gödning håller plantan sig frisk och ger en större skörd.

Gödningen bör fördelas under säsongen, detta för att reducera urlakning och att näringen är tillräcklig under hela växtsäsongen.

Tillförsel av mikronäring skall ses som en försäkring emot brist i plantan.

SoftFruit är en näring som med sitt rika innehåll lämpar sig väl till hallon, jordgubb, blåbär, päron och äpple.

Rekommenderad dos och behandlingstidpunkt

Gröda	Behandlingstidpunkt	Dosering NoroTec™ SoftFruit ml / L vatten
Hallon, jordgubb, blåbär Päron Äpple	Första fas/start: 3 v från plantering Använd SoftFruit1.	3-4 ml / L vatten per tillfälle
	Vegetativ fas: Kombination av SoftFruit1+2 att användas i en 2:1 blandning.	3-4 ml / L vatten per tillfälle
	Generativ fas: Använd SoftFruit2	3-4 ml / L vatten per tillfälle

Blandbarhet

NoroTec™ SoftFruit är komplexbundet och är därför blandbart med flertalet växtskyddsprodukter.

Följ alltid anvisningarna på etiketten för respektive växtskyddsmedel.

Vid tveksamhet kontrollera blandbarheten. Kontakta din leverantör för ytterligare information.

Tillredning och behandling

Sprutbehållaren fylls med ¾ med vatten och ingredienserna tillsätts i den nedan angivna ordningen.

Omrörningen skall vara igång hela tiden.

- Bekämpningsmedel i enlighet med instruktion
- NoroTec™ SoftFruit

Produktdatablad

NoroTec™ SoftFruit 1+2 med mikronäring



Tillredning och behandling

Sprutbehållaren fylls med $\frac{3}{4}$ med vatten och ingredienserna tillsätts i den nedan angivna ordningen.

Omrörningen skall vara igång hela tiden.

- Bekämpningsmedel i enlighet med instruktion
- NoroTec™ SoftFruit
- Fyll därpå resterande mängd vatten

Försiktighetsåtgärder

Vid solig väderlek utförs behandlingarna på morgon eller kväll. Bespruta ej växter som är täckta av vattendroppar eller före väntat regn. Arbetsvätskans temperatur skall vara min 10°C

Rengöring

Spruta: Rengör all sprututrustning före och efter behandlingen. Vid blandning med bekämpningsmedel, följ rengöringsinstruktionen för bekämpningsmedlet.

Tomemballage: Sköljs tre gånger. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Rengjort tomemballage lämnas till avsedd uppsamlingsplats inom kommunen

Lagring

Förvaras i ett svalt och torrt förråd utom räckhåll för barn och djur.

Lagringstemperatur 0 °C till +30 °C. Hållbarhet 2 år.